## ツムラ桂枝加朮附湯およびツムラ麻黄附子細辛湯 にて軽快した顔面痛の1症例

## --- 難治性顔面痛の漢方治療 ---

## 慶應義塾大学医学部 麻酔学教室 山田寛幸, 武田純三, 福島和昭

要旨: 症例は54歳女性, 平成元年に右三叉神経痛(第2枝)および右舌咽神経痛が発症し, 当科で平成4年6月から右星状神経節ブロック, 右舌咽神経ブロックなどが開始された。神経破壊剤による神経ブロックを約2カ月後より追加したが, 初診より約6カ月後に痛みの範囲は縮小したが程度に変化は認められなかった。平成5年4月より当科東洋医学外来でツムラ桂枝加朮附湯7.5g およびツムラ麻黄附子細辛湯7.5g が開始され, 2週間後に痛みは visual analogue scale(VAS)で5/10に改善し, さらにツムラ修治附子末1.5g を追加したところ, その2週間後に痛みは VASで2/10に軽減し, 約2カ月後に痛みはほとんど消失した。本症例は発症より3年後に当科へ紹介され種々の神経ブロックが行われた後に漢方のみを投与した。桂姜棗草黄辛附湯を処方すべく, ツムラ桂枝加朮附湯およびツムラ麻黄附子細辛湯を投与した。患者は冷えを強く訴えたため, さらにツムラ修治附子末を追加し治療効果が高まったと考えられた。

**索引用語:** 顔面痛,漢方治療,桂姜棗草黄辛附湯,桂枝加朮附湯,麻黄附子細辛湯

Hiroyuki Yamada, Junzo Takeda and Kazuaki Fukushima Department of Anesthesiology, Keio University School of Medicine

Abstract: A 54-year-old female patient was introduced to the pain clinic because of severe facial pain from the Department of Neurology in June 1992 after 3 years of treatment under the diagnosis of trigeminal neuralgia.

After precise examination, the pain was diagnosed as right trigeminal neuralgia (maxillary) and right glossopharyngeal neuralgia. After stellate ganglion block, glossopharyngeal block, maxillary block, and others were attempted, the area of pain was decreased but the severity was not improved. Then the patient began to refuse any nerve blocks, Kampo therapy was started in April 1993.

She was administered "Keishi-ka-jutsubu-to" and "Mao-bushi-saishin-to" on account of chilling

(原稿受付 1994年1月18日)

**— 32 —** 

痛みと漢方 Vol. 4 1994 (33)

sensation. After 2 months of the Kampo therapy, the pain almost diminished.

Key words: facial pain, Kampo therapy, Kei-kyo-so-so-o-shin-bu-to, Keishi-ka-jutsubu-to, Mao-bushi-saishin-to