

症 例 報 告

主に東洋医学的治療法で緩解した
顔面痙攣の術後再発症例

佐藤 恭道

別部 智司 雨宮 義弘

鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座

宮本 諭 福島 俊士

鶴見大学歯学部歯科補綴学第二講座

要旨：神経血管減圧術後に顔面痙攣を再発した症例に対して、東洋医学的療法を中心に治療したので報告する。症例は61歳、女性。1988年左側顔面痙攣の診断で神経血管減圧術を行ったが2年程で再発した。手術に対する不安や恐怖のために再手術やブロック療法を拒否していた。1993年痙攣に伴う咀嚼筋群および頸肩部の凝りを主訴に本学歯学部附属病院歯科補綴科を受診した。症状はスプリント療法を含む咬合治療により緩解したが頻回の痙攣やそれに付随する頸肩部の凝りの治療のために1995年2月歯科麻酔科を受診した。治療は主に桂枝加朮附湯を中心とした漢方薬の処方に鍼灸経絡治療を併用した。その結果、痙攣は緩解した。また精神的にも安定し生活も普通にできるようになった。したがって神経血管減圧術後の顔面痙攣再発症例に対して東洋医学的治療を主に行っても、的確な診断により良好な経過をたどり得るのではないかと考えられた。(痛みと漢方6:19-23, 1996)

索引用語：顔面痙攣，神経血管減圧術，漢方薬，歯科，東洋医学，スプリント，鍼灸経絡治療

A recurrent case responded to oriental medicine following microvascular decompression

Yasumichi Sato, Satoshi Beppu and Yoshihiro Amemiya
Department of Dental Anesthesiology, Tsurumi University
School of Dental Medicine
Satoshi Miyamoto and Shunji Fukushima
Department of 2nd Prosthetic Dentistry, Tsurumi
University School of Dental Medicine

Abstract : Hemifacial spasm is a movement disorder of the face, which is characterized by involuntary twitches of muscles innervated by the facial nerve. We report on this recurrent case of post-microvascular decompression that responded well to Oriental medicine. A 61-year-old woman underwent microvascular decompression for left hemifacial spasm in 1988. Symptoms recurred after 2 years, and reoperation was recommended. The patient visited the department of dental anesthesia in 1993, with chief complaint of stiffness in the left part of the face and shoulders. Treatment was performed with an occlusal splint and Oriental medicine, especially Kampo medicine. The patient showed an excellent improvement after adequate treatment. The results suggested that Oriental medicine is effective in the treatment of recurrent hemifacial spasm following microvascular decompression. (Pain and Kampo Medicine 6 : 19-23, 1996)

Key words : hemifacial spasm, microvascular decompression, Kampo medicine, dentistry, oriental medicine, occlusal splint, meridian acupuncture treatment