症例報告

腰椎麻酔下帝王切開後の頭痛に対する五苓散の効果

佐藤泰昌*1 水野智子*1 小野木京子*1 成川 希*2 田上慶子*1 横山康宏*1 山田新尚*1

要旨:帝王切開後の脊椎麻酔後頭痛(PDPH)は、早期離床が妨げられ、また授乳にも影響し、患者のQOLを著しく低下させることになる。PDPHに対し、五苓散を投与したところ、著効が得られた。五苓散のホメオスターシスを保とうとする働きにより、水(髄液)のバランスが正常な状態に戻され、桂皮の発散作用による直接の鎮痛効果と相まって、頭痛が改善されたのではないかと推察された。脊椎麻酔後の頭痛に遭遇した場合、五苓散は治療の一選択肢となると思われた。

索引用語: 五苓散、脊椎麻酔後頭痛、帝王切開

PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol. 18 (2008)

Effect of Goreisan on postdural puncture headache after cesarean section under spinal anesthesia

Yasumasa Sato*¹, Tomoko Mizuno*¹, Kyoko Onogi*¹, Nozomi Narikawa*², Keiko Tagami*¹, Yasuhiro Yokoyama*¹ and Yoshitaka Yamada*¹

Abstract: Postdural puncture headache (PDPH) after cesarean section disturbs the recovery after the operation and the feeding for newborn baby. PDPH was soon reduced after the administration of Goreisan. The treatment of Goreisan is suggested to keep homeostasis and normalize the balance of bodily fluids (Sui) including cerebrospinal fluid, coupled with the emission of vital energy (Ki) by the action of Cinnamomi Cortex (Cinnamon).

It is suggested that Goreisan is effective for the PDPH after the cesarean section.

Key words: Goreisan, postdural puncture headache, cesarean section

^{*1} Department of Obstetrics and Gynecology, Gifu Prefectural General Medical Center *Offprint requests to*: Yasumasa Sato, Department of Obstetrics and Gynecology, Gifu Prefectural General Medical Center. 4-6-1, Noishiki, Gifu City, Gifu 500-8717, Japan

^{*2} Department of Obstetrics and Gynecology, Gifu University Hospital