## 症例報告

## オキシコドン徐放剤による食欲不振に対する 補中益気湯の効果

大久保敏博\* 下馬場睦\* 立川俊一\*

要旨:オピオイドはがん性,非がん性を問わず,今や疼痛管理に欠かせない薬物である.一方その副作用として食欲不振があり,時には患者の予後を左右する.慢性疼痛を有する患者2名と癌性疼痛を有する患者1名にオキシコドン徐放剤を投与したところ,食欲不振が発現した.これに対して補中益気湯(TJ-41)の投与を試みたら症状は速やかに消失した.なお投与に伴う副作用はみられなかった.補中益気湯はオキシコドン徐放剤投与に付随する食欲不振に有効である.

索引用語:オキシコドン徐放剤、食欲不振、補中益気湯

## PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.20 (2010)

Effect of hochuekkito on anorexia due to the adverse effect of oxycodone
— a case report —

Toshihiro Okubo\*, Mutsumi Shimobaba\* and Shunichi Tachikawa\*

**Abstract**: Three patients, one with pain due to pulmonary cancer and the other with chronic pain, were studied. They had anorexia after the administration of oxycontin, though oxycontin improved the pain. In all cases, the treatment with hochuekkito (TJ-41) rapidly and completely reversed anorexia. It was suggested that TJ-41 should be effective for anorexia as an adverse effect of opioid.

Key words: Oxycontin, anorexia, hochuekkito

<sup>\*</sup> Date Redcross Hospital, Department of Anesthesiology Offprint requests to: Toshihiro Okubo, Date Redcross Hospital, Department of Anesthesiology. Suenagachou 81 Date City Hokkaido