

症 例 報 告

当院での帯状疱疹後神経痛に対する漢方処方への検討

高雄由美子*¹ 西本 隆*² 本山泰士*¹ 佐藤仁昭*¹ 溝渕知司*¹

要旨：帯状疱疹後神経痛（PHN）は、急性帯状疱疹の皮疹が治癒した後も遷延もしくは再出現する痛みで、代表的な末梢性神経障害性疼痛であり治療に難渋する。今回われわれはPHN患者に対する当科での漢方薬の処方状況を2008年3月から2013年2月までの5年間で調べて検討した。患者数は232症例であり、このうち漢方薬を処方していた患者は98症例であった。主な処方方は八味地黄丸、牛車腎気丸、当帰四逆加呉茱萸生姜湯、抑肝散、五苓散、補中益気湯、桂枝茯苓丸、補中益気湯であったが、これらの処方が多かった理由としてPHN患者には高齢者が多いこと、症状の悪化に冷えや天気痛が関与していることなどが考えられる。

索引用語：帯状疱疹後神経痛(PHN)、末梢性神経障害性疼痛、漢方薬

PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.24 (2014)

The study of kampo treatment for the post herpetic neuralgia in our department

Yumiko Takao*¹, Takashi Nishimoto*², Yasushi Motoyama*¹, Hitoaki Sato*¹
and Satoshi Mizobuchi*²

Abstract: Post herpetic neuralgia (PHN) is typical peripheral neuropathic pain and intractable. We studied what kind of kampo medicine was prescribed in our department during May 2008~February 2013. The number of PHN patients was 232, and 98 cases were prescribed kampo medicine. Major kampo prescription was hachimijiogan, gosityajinkigan, tokishigyakukagosyuyusyokyo-to, yokukansan, goreisan, hocyuekkito, keishibukuryugan. The reason why these kampo medicines were well prescribed was that most of PHN patients were elderly ones, and their symptom was worsen with coldness and bad weather.

Key words: Post herpetic neuralgia(PHN), peripheral neuropathic pain, kampo

*¹ Department of Anesthesiology, Kobe University Hospital

Offprint requests to: Yumiko Takao, Department of Anesthesiology, Kobe University Hospital.

7-5-2 Kusunoki-cyo, Chuo-ku, Kobe 650-0017, Japan

*² Department of Kampo Medicine, Kobe University Hospital