

## 症 例 報 告

# 外傷により発生した遷延する局所腫脹，疼痛に対する 治打撲一方の有用性について

南 谷 哲 司 \*

**要旨：**整形外科領域において骨折や強度の打撲後に局所の疼痛，腫脹が持続することをしばしば経験する。CRPS (Complex Regional Pain Syndrome) に類似した症状を呈するケースもあり，治療に難渋することがある。このような症例に対し治打撲一方を投与，またプレガバリンの併用により良好な経過を辿った10症例を経験した。何れの症例も投与後2週程度で徐々に腫脹の消退を認め，また投与期間の遷延した症例もあったがほぼ全例に腫脹の軽快を認めた。疼痛の強い症例では通常のNSAIDsの投与が無効であるケースが多く，プレガバリンの併用により疼痛のコントロールが始めて可能であったケースもあった。このような難治性疼痛，腫脹に対する治打撲一方の有効性について考察を行った。

**索引用語：**外傷，腫脹，治打撲一方，CRPS，プレガバリン

## PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.24 (2014)

**Effect of jidabokuippo to improve prolonged swelling and pain caused by fracture or severe contusion.**

Tetusi MINAMITANI \*

**Abstract:** In orthopedics we often experience the cases that the recovery of the intractable swelling or severe pain after the fracture or severe contusion takes a long time. In some cases we have trouble for the medical treatment of the symptom like CRPS (Complex Regional Pain syndrome). We had ten cases that lead to the good healing by the meditation with jidabokuippo or by the combined medication with jidabokuippo and pregabalin. By the treatment with jidabokuippo swelling was decreased within 2 weeks, but in some cases it took a long time to decrease it. Generally NSAIDs is no effective in case with severe pain, but the combined use of jidabokuippo and pregabalin were effective. In this paper the study of jidabokuippo on the intractable swelling or severe pain was reported.

**Key words:** external injury, swelling, jidabokuippo, CRPS, pregabalin

---

\* Minamitani Clinic

Offprint requests to: Tetusi Minamitani, Minamitani Clinic,  
1-2-4 Okamachikita, Toyonaka, Osaka 561-0884, Japan